

EIN BEITRAG ZUR KASUISTIK

DER

KEHLKOPFEXSTIRPATIONEN.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE

IN DER

MEDICIN, CHIRURGIE UND GEBURTSHÜLFE,

WELCHE

NEBST BEIGEFÜGTEN THESEN

MIT ZUSTIMMUNG DER HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT

DER UNIVERSITÄT GREIFSWALD

AM MITTWOCH, DEN 30. MAI 1883,

MITTAGS 1 UHR,

ÖFFENTLICH VERTHEIDIGEN WIRD

CARL AUGUST MARTEN

PRACT. ARZT

AUS POMMERN.

OPPONENTEN:

DR. BRIESE, PRACT. ARZT.

DR. RIEGER, PRACT. ARZT.

LAUER, CAND. MED.

GREIFSWALD.

DRUCK VON CARL SELL.

1883.

DEM ANDENKEN

SEINER

THEUREN ELTERN

AUS VEREHRUNG

GEWIDMET

VOM

VERFASSER.

Eine der neuesten Operationen, welche erst im letzten Decennium ausgeführt und bekannt geworden sind, ist die Kehlkopfxstirpation. Durch Versuche an Hunden stellte zuerst (1870) Vincenz Czerny fest, dass diese Operation mit Erfolg beim Menschen ausgeführt werden könne. Czerny lieferte ferner den Nachweis, dass sogar die tönende Stimme bis zu einem gewissen Grade wiederhergestellt werden kann, wenn an der Stelle des exstirpirten Kehlkopfes eine mit einer beweglichen Metallzunge ausgestattete T-röhre eingelegt wird. Er construirte einen solchen Apparat für seine Hunde, der in einfachster Form das Prototyp des heutigen Tages gebräuchlichen sogenannten „künstlichen Kehlkopfes“ vorstellt.

Uebrigens veröffentlichte schon im Jahre 1829 Albers in Bonn, wie Schüller ¹⁾ in dem Journal für Chirurgie von Gräfe und Walther fand, Versuche über Kehlkopfxstirpation bei Hunden. Er wollte durch diese Versuche nur feststellen, in wie-

¹⁾ Die Tracheotomie, Laryngotomie und Exstirpation des Kehlkopfes. Deutsche Chirurgie von Billroth und Lücke. Lief. 37. Stuttgart, Ferd. Encke, 1880.

weit der Kehlkopf zu der Athmung nöthig sei oder nicht. Albers zog jedoch, wie von Schüller betont wird, keine auf die Ausführbarkeit der Operation beim Menschen bezüglichen praktischen Schlussfolgerungen. Von Langenbeck hebt in seinem Berichte über die von ihm ausgeführte Exstirpation laryngis (21. Juli 1875) hervor, dass er „die Operation in derselben Weise ausführte, wie er sie bereits 1854 in einem ähnlichen Falle, in welchem die Operation aber schliesslich verweigert wurde projectirt und in der Klinik besprochen hatte. Ebenso erwähnt Hueter (in seiner früheren Bearbeitung der Tracheotomie und Laryngotomie), dass „ihm die Idee dieser Operation — der Exstirpation des Larynx — nahegetreten sei, als er vor Jahren (d. h. vor 1870) eine kräftige Frau in den mittleren Jahren an einem Cancroid der Schleimhaut in der Gegend der Cartilagines arytaenoideae dem Tode entgegengehen sah.“

Hueter hatte sich damals auch schon den Plan entworfen, nach einer präliminaren tiefen Tracheotomie den Larynx zu exstirpiren und dann die Schleimhaut des Pharynx an die äussere Haut zu nähen, um durch die so geschaffene Fistel den Patienten zu ernähren.

Endlich macht in der Mittheilung über seinen eigenen Fall Foulis darauf aufmerksam, dass 1855 auch Köberlé die Möglichkeit einer totalen oder partiellen Exstirpation des Kehlkopfes angedeutet habe.

Die erste Kehlkopfexstirpation beim Menschen wurde von Billroth ¹⁾ ausgeführt, drei Jahre nach Czerny's Versuchen an Hunden. Bei diesem Patienten war schon einmal vergeblich der Versuch gemacht worden, ein Larynxcarcinom nach der Spaltung des Kehlkopfes zu beseitigen. Als vier Wochen nach derselben wieder ein umfangreiches Recidiv nachweisbar war, wurde zur definitiven Entfernung der Geschwulst, welche ohnehin schon das Perichondrium durchbrochen hatte, der ganze Kehlkopf aus den umgebenden Weichtheilen und aus seiner Verbindung mit der Trachea herausgelöst. Nach der Heilung der Wunde konnte der Patient mittels eines von Gussenbauer construirten künstlichen Kehlkopfes mit zwar monotoner, aber deutlich vernehmbar tönender Stimme sprechen. Nach einer Mittheilung von Gussenbauer an Schüller bekam Patient vier Monate, nachdem er die Klinik verlassen hatte, ein Recidiv in den Halslymphdrüsen und starb etwa ein Jahr nach der Operation.

Nachdem so die Möglichkeit der Operation am Menschen dargethan worden, folgten bald andere Chirurgen dem Beispiele Billroth's. J. F. Coenen in Amsterdam hat nun in seiner Dissertationsarbeit „über Carcinom des Larynx und seine Behandlung“ (28. Juni 1882) mit Zugrundelegung der Tabelle von

¹⁾ Nach der hinten stehenden Tabelle scheint Patrick Heron Watson aus Edinburg der Erste gewesen zu sein, welcher die Kehlkopfexstirpation ausführte (1866).

Dr. Foulis sechsunddreissig bis dahin bekannte Fälle von Kehlkopfexstirpationen zusammengestellt. Da dieselben in Deutschland in dieser Zusammenstellung nicht bekannt sein dürften, so habe ich aus der Vollständigkeit halber in der folgenden Tabelle mit aufgenommen, den Fall von Billroth im J. 1878 eingeschaltet und die bis jetzt bekannt gewordenen Fälle, soweit ich sie in der Literatur vorgezeichnet fand, hinzugefügt.

Der neueste Fall ist hiernach der von Vogt. Es sei mir an dieser Stelle gestattet, dem Herrn Professor Dr. Vogt dafür, dass er mir diesen interessanten Fall zur Veröffentlichung überliess, die nöthige Literatur zur Verfügung stellte und mich in seinem Rathe in zuvorkommendster und liebenswürdigster Weise an die Hand ging, meinen aller verbindlichsten Dank auszusprechen. Der erwähnte Fall ist folgender:

Ida Steffen, 29 Jahre alt, aus Langenhagen bei Freienwalde, empfand seit dem Juli 1882 Druck im Halse und Schlingbeschwerden. Ende October vorigen Jahres steigerten sich in einer Nacht plötzlich die Erscheinungen, so dass selbst der Speichel nicht herunter wollte. Von nun an war die Ernährung nur mittels geringer Quantitäten flüssiger Nahrung möglich, ja im weiteren Verlaufe kamen Tage, an denen selbst schluckweise genommene Milch und Bouillon nicht die verengte Stelle passiren konnte. Die Patientin, welche stark abmagerte, hatte Gurgelung

und Pinselungen gebraucht. Da sie immer mehr herunterkam, liess sie sich am 5. Februar 1883 in das hiesige Universitätskrankenhaus aufnehmen. Die Patientin, welche an starker Bronchitis litt, war von mittelgrosser schlanker Figur, bis zum Skelet abgemagert. Die laryngoskopische Untersuchung ergab eine bläulich-graue, klein-bohnengrosse Geschwulst, welche die Gegend der Cartilagines Santorini beiderseits einnahm. Die Schlundsonde konnte nicht weiter eindringen, als etwa bis hinter den Kehlkopf. Die Diagnose wurde gestellt auf impermeable Stricture des Oesophagus, bedingt durch Carcinom der hintern Larynx- und vorderen Oesophaguswand.

Der Operation wurde am 11. Februar die tiefe Tracheotomie vorausgeschickt, welcher am 15. die Exstirpation der erkrankten Theile folgte. Um das Hinabfliessen von Blut in die Trachea zu verhindern, was in diesem Falle wegen der Bronchitis besonders zu berücksichtigen war, wurde die Kranke unter Narkose in der Rose'schen Lage operirt, nachdem eine Trendelenburg'sche Tamponkanüle in die Trachea eingeführt war. Die Lagerung wurde in der von Maas (v. Langenbeck's Archiv) beschriebenen Weise hergestellt. Ein Bänkchen wurde unter den Rücken geschoben, dadurch der ganze Oberkörper sammt Hals und Kopf tiefer gelagert, während doch dabei die Kranke völlig bedeckt im Bette bleiben konnte, was bei dem hochgradigsten Schwächezustand von wesentlicher Bedeutung sein

musste. Nach einem Längsschnitte in der Mittellinie, welcher vom Zungenbein bis unter den Ringknorpel verlief, wurden die Weichtheile des Kehlkopfes mit dem Elevatorium ringsum abgehebelt und die zutretenden Arterien, sobald sie sichtbar wurden unterbunden und zwischen je zwei Ligaturen durchschnitten. Nachdem auf diese Weise der Kehlkopf bis auf seine hintere Wand isolirt war, wurde die Trachea unter dem Ringknorpel durchschnitten und mit einem vorher dazu präparirten Schwammstöpsel verschlossen. Dieser Trachealstöpsel war vom Prof. Vogt in der Weise hergestellt, dass um einen zusammengerollten Cylinder aus best-präparirtem Feuerschwamm Jodoformgaze gewickelt war bis zur Dicke des Tracheallumens. Die Tomponkanüle wurde mit einer gewöhnlichen Trachealkanüle vertauscht. Die Operation verlief so blutlos, dass die Trachea vollständig frei geblieben war, was auch durch den aus der Kanülenöffnung ausgehusteten Schleim constatirt werden konnte. Nach dem gesicherten Verschluss der Trachea wurde der Kehlkopf von unten nach oben mit der Epiglottis ausgelöst, wobei ein Theil der vorderen Wand des Pharynx und des Oesophagus in der Länge von einigen Centimetern mit herausgenommen werden musste. Es zeigte sich nun, dass die carcinomatöse Strictur unterhalb des Ringknorpels circular noch tiefer hinabreichte. Für Sonden war dieselbe impermeabel. Um daher die Operation nicht ganz fruchtlos gemacht zu haben, wurde mittels der

Fingers die Dilatation versucht und bis zu mässiger Erweiterung des Lumens auch erzielt. Neben dieser engen Stelle konnte der Finger in eine kleine Höhle geführt werden, welche fast bis an das Sternum reichte und durch Abscedirung entstanden zu sein schien. Von einer Exstirpation dieser Theile konnte wegen der grossen Ausdehnung, zumal dieselbe so tief nach unten ging, keine Rede sein. In der oberen Partie dagegen lag die vordere Muskulatur der Wirbelsäule frei.

Nach Einführung einer Schlundsonde und sorgfältiger Reinigung wurde die Wunde mit Jodoformgaze ausgestopft und hierauf der Verband angelegt. Die genannte Verstöpselung der Trachea bewährte sich hierbei vollkommen, indem keine Spur Flüssigkeit in das Rohr einzudringen vermochte. Noch auf dem Operationstische wurde durch die Schlundsonde mittelst eines Trichters ein Quantum Wein eingeflösst; befragt, ob sie das Vorhandensein und die Wirkung des Weines im Magen spüre, nickte die Patientin bejahend mit dankbarem Blick und Händedruck.

Beim Durchschnitt des Kehlkopfes zeigte sich, dass das Innere desselben bis auf die hintere Wand und hier besonders die Partie der Cast. Santorini gesund war. Die mikroskopische Untersuchung der infiltrirten Theile der hintern Kehlkopf- und vordern Speiseröhrenwand ergab ein Epithelialcarcinom.

Während der nun folgenden Nachbehandlung

schwankte die Temperatur zwischen 37 und 38,5. Am Abende des vierten Tages stieg die Temperatur auf 39. Die Bronchitis war inzwischen eine eitrige geworden; die Kranke hatte viel durch den Husten zu leiden. Der Auswurf war reichlich und sehr zäh, einmal sogar korkig. Die Wunde sah bei jedem Verbandwechsel gut aus (ausgenommen die nicht oestirpirten Theile nahe dem Sternum) und war Folge der Jodoformbehandlung trocken, so dass die Fiebertemperatur auf die Bronchitis zurückzuführen ist. Wurde der Verband erneuert, was täglich geschah, so wurde auch der mit Jodoformgaze umwickelte Schwammpropf erneuert. Diese Art des Verschlusses der Trachea ist viel einfacher, als wenn erst jedesmal, bevor die Wunde irrigirt wird, statt der gewöhnlichen Trachealkanüle die Tamponkanüle eingelegt werden soll, welche dann nachher wieder mit der Trachealkanüle vertauscht werden muss. Ausserdem schliesst die Tamponkanüle nicht immer sicher ab, was aber bei der von Vogt angewandten Methode der Fall ist. Sogleich nach der Operation wurde in einiger Entfernung von der Kranken ein Dampfspray aufgestellt, welcher zuerst 1 % Carbolsäurelösung, später Wasser mit etwas Glycerin und Kochsalz zerstäubte, um die Expectorations durch Verflüssigung der Sekrete zu erleichtern.

Die Ernährung der Kranken geschah durch Zuführung von Milch, Bouillon mit Ei, Wein, Mischkost mit Ei, vermittelst der Schlundsonde, welche p

anent liegen blieb, bisweilen durch Salicylaus-
füllung gereinigt und nur einmal herausgenommen
wurde, wenn sie durch Stückchen von geronnenem
Eiweiss verstopft war.

Die Kranke, welche so lange der Nahrungszufuhr
entbehren müssen, strich sich zum öfteren mit
der Hand die Magengegend, um anzudeuten, wie
wünschthwend ihr die Wiederaufnahme der Nahrung sei.

Jedoch war die Kranke schon zu weit herunter-
gekommen und sie ging, nachdem die Temperatur
am vorletzten Tage Morgens 37, Abends 38,7, am
letzten Tage Morgens 36,3 betragen hatte, am 7.
Tage nach der Operation in Folge von Entkräftung
zu Grunde.

Bedenkt man, unter welchen höchst ungünstigen
Verhältnissen die Operation ausgeführt wurde, so
wird man sich über den so bald erfolgten Exitus
nicht wundern, sondern höchstens fragen können,
warum wohl noch in diesem Falle, wenn die Pa-
tientin doch schon dem Hungertode nahe war, die
Operation ausgeführt wurde. Man vergegenwärtige
sich jedoch die Qualen eines solchen Kranken,
welcher sich dem schrecklichsten Tode sicher preis-
geben sieht und nun zur Ausführung der Operation
zwingt, zufrieden, wenn er nur noch auf kurze Zeit
wieder besser werden kann, und man wird zuge-
ben müssen, dass schon, vom humanen Stand-
punkte aus betrachtet, die Chirurgie helfend ein-
greifen muss.

Aber glücklicherweise sind die Fälle, wie die angeführte, sehr selten. Wie uns die Tabelle lehrt, ist besonders bei alten Leuten über 60 und 70 Jahre der Tod einige Tage nach der Operation erfolgt, gewöhnlich herbeigeführt durch entzündliche Process der Lunge. Doch hatten diese Fälle trotz des Alters der Patienten immer noch eine bessere Prognose als der beschriebene. Wäre derselbe einige Monate früher zur Operation gekommen, so hätte zweifellos das Ende auf längere Zeit hinausgeschoben werden können, zumal in einem früheren Stadium alles Erkrankte zu entfernen gewesen wäre. Und was die Function anbetrifft, so lehrt uns die Literatur, dass die Sprache mittelst des Bruns'schen Kehlkopfes auf völlig befriedigende Weise erzeugt werden kann. Ich will hier nur an die Fälle erinnern von Bergmann, Thiersch und besonders von Billroth, dessen Patient mit seinem künstlichen Kehlkopf dumpf, aber deutlich vernehmbar sprechen und sogar Reden in Comitésitzungen halten konnte.

Ueberhaupt hat in Folge der verbesserten Operationstechnik die Zahl der Erfolge zugenommen. Wenn auch, wie der Holländer Coenen angiebt, nach einer Statistik von v. Bruns unter 19 Fällen von Exstirpation eines Larynxcarcinoms nur ein Fall von radikaler Heilung durch Sands beobachtet worden ist, so zeigt doch die Tabelle, dass wir noch nicht endgiltig über die Frage der Möglichkeit der radikalen Heilung abschliessen können, we

gerade in den letzten Jahren Fälle operirt worden sind, welche unsere weitere Beobachtung erfordern.

So hat Thiersch zwei Patienten operirt (siehe Tabelle 41 und 42), welche $1\frac{1}{2}$ Jahre nach der Operation noch frei von Recidiven waren; gewiss ein sehr günstiges Resultat.

Von Winiwarter's Fall (Tab. 45) ist 11 Monate nach der Operation noch frei von Recidiven; Hahn in Berlin (Tab. 20) operirte einen 63jährigen Mann, welcher sich ihm 1 Jahr später vorstellte; von Recidiv war keine Spur.

Caselli's Patientin, im September 1879 operirt, konnte noch im April 1881 ihre Arbeit gut verrichten (Tab. 25).

Bei dem Falle von Billroth, dessen ich wegen des künstlichen Kehlkopfes bereits Erwähnung gethan (Tab. 21), war nach einem Jahre eine Lymphdrüsenerkrankung bemerkbar.

Ein sehr schönes Resultat hat Bottini in Turin erzielt; der Patient, welcher am 6. Februar 1875 operirt wurde, war noch im April 1881 gesund und fungirte als Briefträger in Miazgina (Tab. 8).

Ausser den Fällen von Caselli und Bottini, welchen Sarcom des Larynx zu Grunde lag, zeigen die eben angeführten sämmtlich carcinomatöse Beschaffenheit.

Berücksichtigt man nun, dass Fauvel (Dissert. von Coenen, S. 44) in 37 von ihm beobachteten Fällen von Larynxcarcinom keinen wahrgenommen

hat, bei dem eine Allgemeininfektion zu Stande gekommen wäre, und sieht man auf die Erfolge der eben beschriebenen Fälle, so lässt sich behaupten, dass in Zukunft die radikale Heilung nach Kehlkopfexstirpation kein *pium desiderium* mehr bleiben werde, sondern dass in vielen Fällen, zumal wenn sie frühzeitig zur Operation kommen, der Operateur nicht nur durch das vollständige Gelingen der technischen Ausführung, sondern auch dadurch auf das Schönste belohnt werden wird, dass der Patient Gesundheit und Functionsfähigkeit der Sprache vermittelst des künstlichen Kehlkopfes wiedererlangt.

Zusammenstellung

der Fälle von

Larynx-Exstirpation.

Nr.	Name des Operators	Datum	Des Patienten		Art der Neubildung	Exstirpirte Theile
			Alter	Geschl.		
1	Patrick Heron Watson. Edinburg.	1866.	36	M.	Syphilis.	Larynx und ein chealring.
2	Billroth. Wien.	1873 31. Dec.	36	M.	Carcinoma laryn- gis.	Ein Theil der b oberst. Trachea Der Ring-, Sch die Giessbecken pel, sowie der r Theil der Epig
3	Heine. Prag.	1874 28. Ap.	50	M.	Carcinoma laryn- gis.	Der ganze lar
4	M. Schmidt. Frankf a. M.	1874 12. Ag.	56	M.	Carcinoma laryn- gis.	Ring-, Schild- (Giessbeckenkne
5	Maas. Freiburg, damals in Breslau.	1874 1. Juni.	57	M.	Adeno-fibroma carcinomatosum.	Der ganze lar
6	P. H. Watson. Edinburg.	1874.	60	M.	Epithelioma la- ryngis.	Der larynx
7	Schönborn. Königsberg.	1875 22. Januar	72	M.	Carcinoma laryn- gis.	Der ganze la
8	Bottini. Turin.	1875 6. Feb.	24	M.	Sarcoma laryngis.	Der ganze la
9	von Langenbeck, Berlin.	1875 21. Jul.	57	M.	Carcinom des obe- ren Theiles des larynx, der epi- glottis und des Zungenbeins.	Der ganze L das Zungenbe Theil der Zung Pharynx und sophagus

Resultat	Bemerkungen	Veröffentlicht in
hergestellt. 3 Wochen später gestorben an Pneumonie.	Patient war in einem sehr schwachen Zustand, und man befürchtete bereits vor der Operation eine Pneumonie.	Tabelle v. Dr. Foulis.
Hergestellt.	Tod durch Recidiv des Carcinoms, 7 Monate nach der Operation.	Archiv für klinische Chirurgie, Band 17, Heft 2, p. 343.
Hergestellt.	Tod durch Recidiv des Carcinoms, 6 Monate später.	Archiv f. klin. Chir., Band 19, p. 584.
am 4. Tage nach Operation an Collaps.		Archiv f. klin. Chir., Band 18, H. 1, p. 189.
2 Wochen nach Operation an Pneumonie.		Archiv f. klin. Chir., Band 19, p. 507.
nach 2 Wochen an Pneumonie.		Tabelle v. Dr. Foulis.
4 Tage nach der Operation.		Berl. klin. Wochenschrift, 1875, No. 38, p. 525.
Leben. Patient ist Träger in Miazina.	Er war noch gesund im April 1881, nach einem Briefe von Prof. Bottini an Dr. Foulis.	„Comunicazione letta Innanzi La R. Academia di Medicina di Torino“ dal Prof. E. Bottini. Seduta del, 30. April 1875.
Hergestellt.	Tod 4 Monate nach der Operation durch Recidiv in den Lymphdrüsen am Halse.	Berl. klin. Wochenschrift, 1875, No. 33, p. 453 u. Archiv für klin. Chir., vol. 21, Supplementb., p. 136.

N ^o	Name des Operateurs	Datum	Des Patienten		A r t der Neubildung	Exstirpirte Theile
			Alter	Geschl.		
10 ¹⁾	Billroth. Wien.	1875 11. Nv.	54	M.	Carcinom des larynx. (diagnostiziert durch Prof. Schrötter.)	Der ganze larynx
11	Maas. Freiburg.	1876 5. Feb.	50	M.	Epitheliom des larynx.	Der ganze larynx ausgenommen epiglottis und kleiner Theil Ringknorpel
12	Gerdes. Jever.	1876 30. Mz.	76	M.	Carcinom.	Der ganze larynx
13	Reyher. Dorpat.	1876 Mai.	60	M.	Carcinom an den Stimmbändern.	Der ganze larynx die halbe epiglottis
14	P. H. Watson, Edinburg.	1876.	60	W.	Epitheliom des larynx und der nächsten Lymphdrüsen.	Larynx und die nächsten Lymphdrüsen
15	Kosinski. Warschau.	1877 15. Mz.	36	W.	Epitheliom des larynx mit Perforation der Haut.	Der ganze larynx
16	Foulis. Glasgow.	1877 10. Spt.	28	M.	Theils Papillom, theils Sarkom	Der ganze larynx
17	Wegner. Berlin.	1877 17. Spt.	52	W.	Carcinom des larynx, wallnussgr.	Der ganze larynx der epiglottis und obere Hälfte Ringknorpel
18	Bottini. Turin.	1877 29. Ag.	48	M.	Epitheliom des larynx.	Der ganze larynx ein Theil des Pharynx

¹⁾ Nach Schüller (Deutsche Chirurgie, Lieferung 37) hat Billroth diese Operation bereits am 11. November 1874 gemacht.

Resultat	Bemerkungen	Veröffentlicht in
am 2. Tage nach Operation in Fol- ge von Pneumonia crouposa. Hergestellt.	Drei Monate später Recidiv im hinteren Theil der Zunge. Operation wird nicht gestattet. Tod 6 Monate nach der Ope- ration durch Hämorrhagie aus dem ulcerirenden Carcinom.	Tabelle v. Dr. Foulis. Archiv f. klin. Chir., Band 15, p. 535.
am 4. Tage durch Collaps. am 11. Tage nach Operation durch metastatische Pneu- monie. nach einer Wo- che durch Embolie in den Lungen.		Archiv f. klin. Chir., Band 21, H. 2, p. 437. „St. Petersburg. Me- dicin. Wochenschr.“ 1877, No. 17 u. 18.
Hergestellt.	Patient starb 9 Monate nach der Operation an Recidiv.	Tabelle v. Dr. Foulis. Centralblatt f. Chir., No. 26, 1877, p. 401.
Hergestellt.	Tod in Folge von Phtisis pul- monum und phtisis laryngis.	„Lancet“ Oct. 13, 1877, März 1879.
Hergestellt. 7 Mon. nach der Operation kein Recidiv.	Auf dem Congress der deutschen Chirurgen zu Berlin vorgestellt am 12. April 1878.	Tabelle v. Dr. Foulis.
am 3. Tage in Folge von doppel- seitiger Pneumonie.	Die Operation wurde mit dem Galvanokauter und ohne Blut- verlust ausgeführt.	„Annales des Mala- dies de l'Oreille et du larynx“ juillet I, 1878.

N ^o	Name des Operateurs	Datum	Des Patienten		Art der Neubildung	Exstirpation Theile
			Alter	Geschl.		
19	von Bruns. Tübingen.	1878 29. Januar	54	M.	Epitheliom des larynx.	Der ganze larynx.
20	Rubio. Madrid.	1878 11. Mai	41	M.	Neckrose der Larynxknorpel.	Der ganze larynx.
21 1)	Billroth. Wien.	1878 Juli.		M.	Carcinom der linken Hälfte des larynx.	Nur die linke entfernt; die rechte Hälfte des grössten Theils des rechten Stimmknorpels zurückgelassen.
22	Czerny. Heidelberg.	1878 24. Ag.	46	M.	Sarkom v. Wallnussgrösse.	Der larynx u. Larynxdrüsen.
23	Billroth. Wien.	1879 2. Fbr.	43	W.	Epithelialcarcinom des larynx, pharynx und der Schilddrüse.	Der ganze larynx, einem Theil des pharynx und des oesophagus.
24	Macewen. Glasgow.	1879 31. Jul.	56	M.	Carcinom des larynx, oesophagus und der Lymphdrüsen an der linken Seite des Halses.	Der larynx, ein Theil des oesophagus und die Lymphdrüsen.
25	Caselli. Reggio Emil.	1879 20. Spt.	19	W.	Sarkom des larynx, pharynx, des Gaumens und der Zungenbasis.	Der larynx, pharynx, die Basis der Zunge und die Tonsillen.

1) Dieser Fall ist in der Tabelle von J. F. Coenen nicht angeführt.

Resultat	Bemerkungen	Veröffentlicht in
Hergestellt.	Die Tracheotomie wird nicht vorausgeschickt. Tod am 1. November 1878 in Folge von Recidiv.	„Wien. Med. Presse“, Nov. 17, 1878.
am 5. Tage an Marasmus.		„Observacion clinica“ etc. Real Academia de Med. Madrid 1878.
Hergestellt. Sprache ne künstl. Kehlpf dumpf, aber atlich vernehmbar.	Patient konnte sogar Reden in Comitésitzungen halten. Nach einer brieflichen Mittheilung von Prof. Billroth lebte Patient noch im Juni 1879, doch war schon eine Lymphdrüsenerkrankung bemerkbar.	Deutsche Chirurgie, Liefg. 37 von Dr. Schüller, 1830.
Hergestellt.	Wiederholte Exstirpation von Recidiven. Tod am 30. November 1879.	Brief vom Geh. Hofrath Czerny an J. F. Coenen.
Hergestellt.	Tod 6 Wochen nach der Operation in Folge des Durchtritts des Bougie's in das mediastinum.	Tabelle v. Dr. Foulis u. Mittheilung von Prof. Billroth an J. F. Coenen.
am nach 3 Tagen in Folge v. Pneumonie.		Case books of Glasgow Royal Infirmary.
Hergestellt.	Konnte im April 1881 ihre Arbeiten gut verrichten.	„Bulletino delle Scienze Med. di Bologna“ 1880 u. Tabelle von Dr. Foulis.

N ^o	Name des Operators	Datum	Des Patienten		Art der Neubildung	Exstirpir Theile
			Alter	Geschl.		
26	Lange. New-York.	1879 12.Oct.	74	M.	Sarkom des la- ryn timer mit Infiltra- tion des oesopha- gus.	Der larynx, rechte Horn Zungenbeines Theil des oesoph.
27	Carl Reyher. St. Petersburg.	1880.	48	M.	Carcinom.	Larynx.
28	Czerny. Heidelberg.	1880 11.Oct.	47	M.	Epitheliom des larynx u. der um- liegenden Weich- theile.	Larynx u. die umliegenden Weichteile
29	Dr. Hahn. Berlin.	1880 23.Oct.	63	M.	Carcinom des la- ryn timer von Wall- nussgrösse.	Der ganze larynx ein Theil der Glottis.
30	H. Bircher. Aarau.	1880 3. Dec.	49	W.	Scirrhus d. Schild- drüse mit Infiltra- tion des larynx.	Die Schilddrüse stirpt. 6 M. später Recidiv; mit einem Theil des oesophagus exst.
31	Pick. London.	1881 16. Januar	39	M.	Epitheliom des larynx.	Larynx u. epiglot- tis.
32	Foulis. Glasgow.	1881 30. Ap.	50	M.	Epitheliom des larynx.	Der larynx
33	Tilanus. Amsterdam.	1881 12. Mai	50	M.	Carcinom des la- ryn timer mit Infiltra- tion der vorderen Wand des oeso- phagus.	Der ganze larynx ein Theil der vor- deren Wand des oesophagus und ein Theil der epiglottis.
34	Czerny. Heidelberg.	1881 12. Mai	47	M.	Epitheliom.	Der larynx und zwei obersten Ringe.

e s u l t a t	B e m e r k u n g e n	V e r ö f f e n t l i c h t i n
Hergestellt.	Recidiv des Sarcoms. Tod 6 Monate und 24 Tage nach der Operation in Folge von asthenie.	„Archives of Laryn- gology“ I, p. 36.
am 7. Tage in re von septischer uchopneumonie. Hergestellt.	Die Lymphdrüsen ergriffen am 7. Januar 1881. Tod in Folge von Erschöpfung und Blutver- lust am 25. März 1881.	Wolner's „Med. Jour- nal“, 1880, Heft I.
Hergestellt.	Im October 1881 stellte sich Patient Herrn Dr. Hahn vor; er fühlte sich vollkommen wohl. Von Recidiv keine Spur.	Brief von Dr. Hahn an J. F. Coenen.
nach 16 Tagen olge von Pneu- e u. Gangraena pulmonum.		Tabelle v. Dr. Foulis.
in Folge von ritis und Peri- carditis. Hergestellt.		„Lancet“, April 2, 1881, p. 541.
Hergestellt.	Kehrte 5 Wochen nach der Operation nach Hause zurück, war damals gesund und stark.	„Brit. Med. Jour.“ Mai 7 u. Juni 11, 1881.
nach 36 Stunden ollaps. (Keine Section.)	Patient war vor der Operation sehr geschwächt durch lang- dauernden Mangel an Nahrung.	Dissert. von Coenen.
Hergestellt.	Kehrte nach Hause zurück, war im September 1881 wohl und stark.	Tabelle v. Dr. Foulis.

N ^o	Name des Operators	Datum	Des Patienten		Art der Neubildung	Exstirp Theil
			Alter	Geschl.		
35	Carl Reyher. St. Petersburg.	1881 14. Mai	57	M.	Carcinom des larynx.	Der larynx
36	Dr. Völker. Braunschweig.	1881 28. Mai	44	W.	Epithelialcarcinom des larynx.	Der ganze larynx die Schilddrüse
37	Dr. Hahn. Berlin.	1881 12. Aug.	46	M.	Carcinom des larynx; hühnereigrosser Tumor, der die ganze linke Seite des larynx einnahm.	Der ganze larynx; das linke Horn Zungenbeins, glottis u. die Wand des oesophagus an der linken Seite
38	Gussenbauer.				Carcinom des larynx.	
39	Wien.					
40	Caselli. Reggio.	1880.	27	M.	Fibro-enchondromatomyxomatousum des Zungenbeins und des larynx.	Entfernung mor's und Abtheilung des oberen Theils Schilddrüse epiglottis
41	Thiersch. Leipzig.	1880 26. Januar	36	M.	Adeno-Carcinom des larynx.	Larynx u. ein Theil der vorderen Wand des oesophagus
42	Thiersch. Leipzig.	1880 15. Ap.	52	M.	Epithelial-canceroid.	Larynx

¹⁾ Ich kann an dieser Stelle der beiden Fälle von Prof. Gussenbauer in Wien auch nur, wie Coenen, Erwähnung thun, da mir näheres bekannt.

e s u l t a t	B e m e r k u n g e n	V e r ö f f e n t l i c h t i n
am 5. Tage in ge von septischer nchopneumonie.		Tabelle v. Dr. Foulis.
Hergestellt.	Tod 5 Monate nach der Operation in Folge von Luftmangel dadurch, dass die Patientin die Kanüle herausgenommen hatte, um sie zu reinigen. Andere Ursachen hat die Obduction nicht ergeben.	Mittheilung von Dr. Völker an J. F. Coenen.
Hergestellt.	Tod am 8. September in Folge von gangraena pulmonum.	Mitgetheilt von Dr. Hahn an J. F. Coenen.
nach etwas über tund. an Collaps.	Nach Coenen sind die beiden Exstirpationen mit gutem Erfolge ausgeführt. Die Section ergab nichts besonderes.	Annal. univ. di med. e chir. 1880, Dec.
Hergestellt.	18 Monate nach der Operation noch frei von Recidiven.	Deutsche Zeitschrift f. Chir., 1881, Band 16, p. 149—170.
Hergestellt.	Patient trägt den Bruns'schen künstlichen Kehlkopf, ist als Waldarbeiter selbst im Winter thätig gewesen und 17 Monate später frei von Recidiven.	Deutsche Zeitschrift f. Chir., 1881, Band 16, p. 149—170.

No.	Name des Operateurs	Datum	Des Patienten		Art der Neubildung	Exstirpi- Theile
			Alter	Geschl.		
43	Thiersch. Leipzig.	1880 10. Nv.	45	W.	Drüsencarcinom des oesophagus u. larynx.	Larynx, pharynx, oesophagus. letztere wird dem ingulum trennt u. nach bis zum Zungen- de gelö-
44	Thiersch. Leipzig.	1881 17. Januar	57	W.	Drüsencarcinom des pharynx, des oesophagus u. der hinteren Kehl- kopfwand.	Larynx, pharynx, oesophagus, d. tere auf etwa gelöst.
45	von Winiwarter.	1881 19. Ap.	55	W.	Carcinom des larynx.	Larynx.
46	Albert. Wien.	1881 6. Juli.	45	M.	Carcinom des larynx.	Larynx und I- drüsen.
47	v. Bergmann. Würzburg.	1882 12. Januar	54	M.	Exulceration und Infiltration des ganzen linken Stimmbandes, Verengung der Stimmritze.	Larynx
48	Dr. Multanowski.	1882.	47	M.	Carcinom der rechten Hälfte des larynx.	Zuerst Entfer- der rechten L- nach 3 Monate ganze larynx- ge von Rec-
49	Dr. Multanowski.	1882.	59	M.	Carcinom des larynx,	Larynx.
50	Dr. Multanowski.	1882.	60	M.	Carcinom des larynx.	Larynx.

e s u l t a t	B e m e r k u n g e n	Veröffentlicht in
n Folge erneuter ive u. Blutung 16. März 1881.	Ausgedehnte Carcinomrecidive in den Drüsen am Halse und im Mediastinum, carcinomatöse Durchwachsung des Körpers, des 4. und 5. Halswirbels, so- wie der Carotiswand.	Deutsche Zeitschrift f. Chir., 1881, Band 16, p. 149—170.
am 7. Tage in e von Lungen- affection.	Aeltere Abscesse und frische Infarkte in den Lungen; Meta- stasen nicht nachweisbar.	Deutsche Zeitschrift f. Chir., 1881, Band 16, p. 149—170.
hergestellt.	11 Monate nach der Operation noch frei von Recidiv.	Liège 1882.
am 8. Tage an snach Blutung.	Die Section ergab diffuse Bronchitis, lobuläre Pneumonie.	Wiener med. Presse, 1881, No. 44.
hergestellt.	Gute Sprache mittels des Bruns'- schen künstlichen Kehlkopfes.	Wratsch 1882, No. 14.
ach 2 Monaten lge v. Recidiv.		Red. des Wratsch.
ach 3 Monaten lge kroupöser neumonie.		Red. des Wratsch.
am 5. Tage in v. consecutiver neumonie.		Red. des Wratsch.

No	Name des Operateurs	Datum	Des Patienten		Art der Neubildung	Exstirpi- Theile
			Alter	Geschl.		
51	Margary. Turin.	1882.	36	W.	Epitheliarcari- nom des larynx und oesophagus.	Larynx u. ei- des pharynx phagus
52	Ruggi.	1882.	10	M.	Massenhafte po- lypöse Wuche- rung des ganzen Kehlkopfes.	Exstirpation zen larynx mit galvanokaust. Messers
53	P. Vogt. Greifswald.	1883 15. Fbr.	29	W.	Epithelialcarci- nom des pharynx und oesophagus.	Larynx u. ei- des pharynx phagus

e s u l t a t	B e m e r k u n g e n	V e r ö f f e n t l i c h t i n
Hergestellt.	Nach 3 $\frac{1}{2}$ Monaten erste Anzeichen eines Recidivs.	Separatabdruck aus Archiv. ital. di laringologia Napoli, 1882. Anno I, fasc. 3.
Hergestellt.	Deglutination frei, normales Aussehen des Halses.	Raccogli med. 1882. 20 Lugl.
am 7. Tage der Operation ge v. Inanition.	Patientin war schon vor der Operation moribund in Folge von Mangel an Nahrung. Bereits 3 $\frac{1}{2}$ Monate vor der Operation konnte selbst der Speichel kaum hinuntergeschluckt werden.	

Lebenslauf.

Verfasser, Carl August Marten, wurde am 29. April 1855 in Neuenkirchen bei Stettin geboren als Sohn des verstorbenen Gutsbesitzers Carl Marten und seiner ebenfalls verstorbenen Ehefrau Caroline, geb. Tancré. Den ersten Schulunterricht genoss er in der Friedrich - Wilhelms - Schule, Realschule I. Ordnung in Stettin, welche er bis zur Tertia besuchte. Hierauf nahm er, da er sich dem Studium der Medizin widmen wollte, ein halbes Jahr Privatunterricht im Griechischen und Lateinischen und ging dann zur Sievert'schen Schule über, wo er verblieb, bis das neue Stadtgymnasium in Stettin bezogen wurde. Auf dieser Schule absolvirte er Ostern 1875 das Abiturientenexamen.

Am 15. April 1875 wurde er in Greifswald von dem Dekan der med. Facultät immatriculirt; im Herbst desselben Jahres ging er nach Würzburg, wo er drei Semester blieb. Von hier nach Greifswald zurückgekehrt, absolvirte er nach bestandenem Tentamen physicum am 4. August 1881 das Examen rigorosum und vom März 1882 bis zum 17. Februar 1883 das Staatsexamen, nachdem er während des letzteren die viermonatliche Vertretung eines Arztes übernommen hatte.

Im Sommer-Semester 1880 hatte er inzwischen seiner Militär - Dienstpflicht in der 9. Compagnie des Grenadier-Reg. König Friedrich Wilhelm IV. 1. pommerschen No. 2 in Stettin genügt.

Gehört hat der Verfasser während seiner Studienzeit folgende Herren Professoren und Docenten:

In Würzburg.

Prof. Dr. *Fick*, Prof. Dr. *Kohlrausch*, Geh. Rath Prof. Dr. *von Kölliker*, Prof. Dr. *Sachs*, Prof. Dr. *Wislicenus*.

In Greifswald.

Prof. Dr. *Arndt*, Geh. Rath Prof. Dr. *Budge*, Prof. Dr. *Eichstedt*, Prof. Dr. *Eulenburg*, Prof. Dr. *von Feilitzsch*, Prof. Dr. *Grohé*, Prof. Dr. *Häckermann*, Dr. *Hänisch*, Prof. Dr. *Hüter*, Prof. Dr. *Krabler*, Prof. Dr. *Landois*, Prof. Dr. *Limpricht*, Prof. Dr. *Mosler*, Prof. Dr. *Münter*, Geh. Rath Prof. Dr. *Pernice*, Dr. *von Preuschen*, Prof. Dr. *Schirmer*, Prof. Dr. *Schüller*, Prof. Dr. *Vogt*.

Allen diesen Herren sagt der Verfasser seinen verbindlichsten Dank.

THESEN.

I.

Die Diphtheritis ist in den meisten Fällen, sobald sie nur rechtzeitig erkannt und in ärztliche Behandlung kommt, mit Erfolg zu bekämpfen.

II.

Die partiellen Resectionen sind den totalen bei Kindern vorzuziehen.

III.

Bei puerperalen Prozessen werden in den ersten Tagen des Wochenbettes statt der Carbolirrigationen des uterus besser Ausspülungen mit Salicyllösungen gemacht.
